

# Bemonsteringsaanpak

Op vrijwel elk varkensbedrijf komen salmonellabesmettingen voor, ook als u het niet aan de varkens merkt. Voor een effectieve aanpak van salmonella is het daarom belangrijk om vast te stellen waar de besmetting plaatsvindt. Dit kan via onderzoek van omgevings- en mestmonsters, onze protocollen staan op de achterzijde benoemd. De monsters kunt u verzamelen met behulp van slofjes met hieronder het stappenplan.



## Voorbeeld bemonsteringsprotocollen Salmonella

### **Vleesvarkenbedrijf** (voorkeur bij screening met focus op zware vleesvarkens)

- In een schoon hok
- In de centrale gang
- Een halve dag na opleg
- In de gang in een afdeling met zware varkens
- In een hok met zware dieren, liefst na het leveren van de koplopers

### **Vleesvarkenbedrijf** (voorkeur bij eerste screening)

- In een schoon hok
- In de centrale gang
- Een halve dag na opleg
- In een hok met varkens halverwege de mestperiode
- In een hok met zware dieren, liefst na het leveren van de koplopers

### **Vermeerderingsbedrijf** (voorkeur bij screening met focus op batterij)

- In de centrale gang
- In de dragende zeugen stal
- In een hok met varkens een halve dag na opleg op de batterij
- In een hok met varkens halverwege de batterijfase
- In een hok met varkens aan het einde van de batterijfase

### **Vermeerderingsbedrijf** (voorkeur bij screening met focus op zeugen)

- In de dekstal
- In de dragende zeugen stal
- In de kraamstal
- In een hok met varkens een halve dag na opleg op de batterij
- In een hok met varkens aan het einde van de batterijfase

Ook op vermeerderingsbedrijven kan uiteraard een schoon hok bemonsterd worden. N.B. U kan/mag ook met een paar slofjes door meerdere hokken lopen, wel opletten in geval van diarree, etc.